


INCONTINENCE URINAIRE

Octobre 2011 – Messages-clés



ANTICHOLINERGIQUES

Effets indésirables	Contre-indications	Interactions	
<p>Très souvent (≥10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sécheresse de bouche • Oxybutynine TS: réactions cutanées <p>Souvent (1-10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sécheresse des yeux • Dyspepsie, nausées, constipation • Mydriase / troubles de l'accommodation • Vertiges et céphalées • Dysurie • Insomnie <p>Peu fréquents, mais graves (0,1-1%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tachycardie, arythmies et insuffisance cardiaque • Fatigue et somnolence • élévation des enzymes hépatiques • Rétention urinaire • Vertiges, rarement délire +/- agitation 	<ul style="list-style-type: none"> • Grossesse et allaitement • Glaucome à angle fermé • Reflux gastro-œsophagien • Sténose du pylore, atonie intestinale, iléus paralytique • Colite ulcéreuse sévère • Myasthénie grave • Insuffisance hépatique sévère • Rétention urinaire 	<ul style="list-style-type: none"> • Effet additif anticholinergique en cas d'association à d'autres substances anticholinergiques • Diminution de l'effet des médicaments qui augmentent la motilité gastro-intestinale • Fésotérodine et toltérodine: prudence lors de l'association à des médicaments pouvant prolonger l'intervalle QT • Oxybutynine, propivérine et solifénacine: ↗ concentrations plasmatiques en cas d'utilisation concomitante d'inhibiteurs du CYP3A4 • Darifénacine, fésotérodine et toltérodine: ↗ concentrations plasmatiques en cas d'utilisation concomitante d'inhibiteurs du CYP3A4 ou CYP2D6 	
	Précautions		
	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes âgées plus sensibles aux effets indésirables → diminuer dose • attention aux anticholinergiques 'cachés' • risque de déclin cognitif • Hypertrophie de la prostate • Diarrhée, fièvre • Tachycardie, hypertension et infarctus du myocarde • Neuropathie autonome • Insuffisance rénale (fonction gravité) 		

DCI – Noms commerciaux	Dose initiale	Dose max
Oxybutynine <i>Ditropan</i> ® et gén.	5mg 2-3x/j	5mg 3x/j
Oxybutynine patch <i>Kentera</i> ®	2x/sem	2x/sem
Toltérodine <i>Detrusitol (Retard)</i> ®	2mg 2x/j Retard 4mg 1x/j	4mg/j
Propivérine <i>Mictonorm (Uno)</i> ®	15mg 2x/j avant repas Uno 30mg 1x/j	45mg/j
Darifénacine <i>Emselex</i> ®	7,5mg 1x/j	15mg 1x/j
Solifénacine <i>Vesicare</i> ®	5mg 1x/j	10mg 1x/j
Fésotérodine <i>Toviaz</i> ®	4mg 1x/j	8 mg 1x/j

www.farmaka.be

Visiteurs indépendants → Documents → Incontinence urinaire

www.cbip.be

Répertoire, Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) via symbole «gélule bleue»  en regard du médicament, Comparateur de prix via symbole « euro » 

www.fagg-afmps.be

RCP, Notifications d'effets indésirables , ...

www.cebam.be

www.prodigy.clarity.co.uk (inscription gratuite) (anciennement CKS)

